

レジメン一覧

2026年2月時点

レジメン名		投与日数	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
1	AC	1コース 3週間 アプレピタント、 デキサメタゾン8mg	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg:60mg/m ² Day1 インドキサン注射用:600mg/m ² Day1
1	AC (アロカリス点滴使用)	1コース 3週間 デキサメタゾン8mg	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg:60mg/m ² Day1 インドキサン注射用:600mg/m ² Day1
5	EC	1コース 3週間 EPI75~90mg/m ² アプレピタント、 デキサメタゾン8mg	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/m ² Day1 インドキサン注射用:600mg/m ² Day1
5	EC (アロカリス点滴使用)	1コース 3週間 EPI75~90mg/m ² デキサメタゾン8mg	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/m ² Day1 インドキサン注射用:600mg/m ² Day1
6	PTX(転移再発)	PAC専用輸液セット 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
7	DTX(初期治療)	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day1
7	DTX(転移・再発)	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1

12	weekly-PTX (初期治療1)	PAC専用輸液セット 1コース 16週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液3.3mg:1A Day22 Day29 Day36
12	weekly-PTX (初期治療2)	PAC専用輸液セット 1コース 16週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液1.65mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
13	H(初回) B法	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1
13	H(バイオミラー) (初回) B法	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1
13	H(2回目以降) B法	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1
13	H(バイオミラー) (2回目以降) B法	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1

14	VNR	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ナベルピン注:25mg/m ² Day1 Day8
19	TC	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1 エンドキサン注射用:600mg/m ² Day1
21	nabPTX	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1
22	GEM	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注射用:1250mg/m ² Day1 Day8
23	HAL	1コース 3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m ² Day1 Day8
24	PTX + Bmab	PAC専用輸液セット 使用 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:90mg/m ² Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注射:10mg/kg Day1 Day15
24	PTX + Bmab (バイオミラー)	PAC専用輸液セット 使用 1コース 4週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:90mg/m ² Day1 Day8 Day15 ベバシズマブBS点滴静注:10mg/kg Day1 Day15
30	フルベストラント(導入)	1コース 8週間 d29以降は4週間 毎	フェソロデックス筋注250mg:2筒 Day1 Day15 Day29

30	フルベストラント (4回目以降)	1コース 4週間	フェソロデックス筋注250mg:2筒 Day1
31	PER + H (初回)	infusion reaction に注意 ハーセプチン継続の場合 合容量注意 1クール3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1
31	PER + H(2回目以降)	infusion reaction に注意 1クール3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1
34	PTX + H(初期治療) (12回)	PAC専用輸液セット 1コース 13週間	ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day22 Day43 Day64 注射用水(20mL):1A Day1 Day22 Day43 Day64 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day22 Day43 Day64 デキサート注射液3.3mg:1A Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78

34	PTX+H (ハイオミラー) (初期治療)(12回)	PAC専用輸液セット 1コース 13週間	<p>トラスツスマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day22 Day43 Day64 注射用水(20mL):1A Day1 Day22 Day43 Day64 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 パクリタキセル注射液:80mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78 トラスツスマブBS点滴静注用:6mg/kg Day22 Day43 Day64 デキサート注射液3.3mg:1A Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 Day71 Day78</p>
35	DTX+PER+H (初回)	infusion reaction に注意 ハーセプチン継続 の場合容量注意 1クール3週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day1</p>
35	DTX+PER+H (ハイオミラー) (初回)	infusion reaction に注意 トラスツスマブ継続の場合 用量注意 1クール3週間	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 トラスツスマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day1</p>

35	DTX+PER+H (2回目以降)	infusion reaction に注意 1クール3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1
35	DTX+PER+H (バイオミラー) (2回目以降)	infusion reaction に注意 1クール3週間	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1
37	トラスツズマブエムタンシ	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 カドサイラ点滴静注射:3.6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1
38	nabPTX+アテゾリズマ		生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注840mg/14mL:840mg Day1 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day15 生食注 50mL:1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15

39	PTX+PER+H (初回)	infusion reaction に注意 ハーセプチン継続 の場合容量注意 1クール3週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
39	PTX+PER+H (ハイ オミラー) (初回)	infusion reaction に注意 トラスツマブ 継続の場合 用量注意 1クール3週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:840mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 トラスツマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
39	PTX+PER+H (2回目以降)	infusion reaction に注意 ハーセプチン継続 の場合容量注意 1クール3週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15

39	PTX + PER + H (バイオミラー) (2回目以降)	infusion reaction に注意 トラスツマブ 継続の場合 用量注意 1クール3週間	5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生食注 50mL:1瓶 Day1 トラスツマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
40	トラスツマブ エムタンシン (術後補助)(14回分)	3週1クール 14クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 カドサイラ点滴静注:3.6mg/kg Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274 注射用水(20mL):1A Day1 Day22 Day43 Day64 Day85 Day106 Day127 Day148 Day169 Day190 Day211 Day232 Day253 Day274
41	トラスツマブ デルクステカン	3週1クール	5%ブドウ糖液(100mL):1瓶 Day1 エンハーツ点滴静注用100mg/5mL:5.4mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1

42	<p>^°ムジ`叫ス`マジ` +PTX +CBDCA</p>	<p>3週間1クール アプレピタント、 デキサメタゾン4mg</p>	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m² Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:200mg Day1</p>
43	<p>^°ムジ`叫ス`マジ` +EC</p>	<p>1コース 3週間 EPI75~90mg/m² アプレピタント、 デキサメタゾン8mg</p>	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/m² Day1 エンドキサン注射用:600mg/m² Day1</p>
43	<p>^°ムジ`叫ス`マジ` +EC (アロカリス点滴使用)</p>	<p>1コース 3週間 EPI75~90mg/ m²、 デキサメタゾン8mg</p>	<p>生食注 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 エピルビシン塩酸塩注射用:90mg/m² Day1 エンドキサン注射用:600mg/m² Day1</p>
44	<p>^°ムジ`叫ス`マジ`</p>	<p>3週1クール</p>	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:200mg Day1</p>
45	<p>dose-dense AC</p>	<p>1コース 2週間 4コース アプレピタント、 デキサメタゾン8mg</p>	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg:60mg/m² Day1 エンドキサン注射用:600mg/m² Day1</p>
45	<p>dose-dense AC (アロカリス点滴使用)</p>	<p>1コース 2週間 4コース デキサメタゾン8mg</p>	<p>生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg:60mg/m² Day1 エンドキサン注射用:600mg/m² Day1</p>

46	ヘムジカ + GEM + CBDCA	3週1クール	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注100mg/4mL:200mg Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 5%ブドウ糖液(100mL):1瓶 Day1 ゲムシタビン点滴静注射用:1000mg/m ² Day1 Day8 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:2 Day1 Day8
47	フェスゴ配合皮下注IN (初回)	1コース 3週間 初回投与 前回投与から6週間以上間隔が空いた場合は、改めてでINを選択	フェスゴ配合皮下注IN:1瓶 Day1
47	フェスゴ配合皮下注 MA (2回目以降)	11コース 3週間 2回目以降 前回投与から6週間以上間隔が空いた場合は、改めてでINを選択	フェスゴ配合皮下注MA:1瓶 Day1
48	フェスゴIN + DTX (初回)	1コース 3週間 初回投与 前回投与から6週間以上間隔が空いた場合は、改めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1 フェスゴ配合皮下注IN:1瓶 Day1
48	フェスゴMA + DTX (2回目以降)	1コース 3週間 初回投与 前回投与から6週間以上間隔が空いた場合は、改めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1 フェスゴ配合皮下注MA:1瓶 Day1
49	フェスゴIN + PTX (初回)	1コース 3週間 初回投与 前回投与から6週間以上間隔が空いた場合は改めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 フェスゴ配合皮下注IN:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポラミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15

49	フェスゴ [®] MA + PTX (2回以降)	1コース 3週間 初回投与前回投与 から6週間以上間隔 が空いた場合は、改 めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 フェスゴ配合皮下注MA:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15
50	フェスゴIN + DTX +CBDCA (初回)	1コース 3週間 6週間以上間隔が 空いた場合は、 改めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1 フェスゴ配合皮下注IN:1瓶 Day1
50	フェスゴMA + DTX +CBDCA (2回目以降)	1コース 3週間 6週間以上間隔が空 いた場合は、 改めてでINを選択	生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注射液:0mg/A AUC:5 Day1 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 デキサート注射液3.3mg:1A Day1 ドセタキセル点滴静注射用:75mg/m ² Day1 フェスゴ配合皮下注MA:1瓶 Day1
51	サシツズマブ ゴビテカン	3週1クール アセトアミノフェン服用	生食注 50mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 100mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液バッグ250mL:1袋 Day1 Day8 トロデルビ点滴静注用200mg/50mL:10mg/kg Day1 Day8 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液3.3mg:3A Day1 Day8 ポララミン注5mg:1A Day1 Day8 ファモチジン静注液20mg/20mL:1A Day1 Day8
52	ダトポタマブ デルクステカン	3週1クール アセトアミノフェン服用	5%ブドウ糖液(100mL):1瓶 Day1 ダトロウェイ点滴静注用100mg:6mg/kg Day1 注射用水(20mL):1A Day1 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 アロカリス点滴静注用235mg10mL:1瓶 Day1 ポララミン注5mg:1A Day1 デキサート注射液3.3mg:3A Day1